

В Республике Беларусь вакцинацию проводят в соответствии с Национальным календарем (двукратно детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет), и по эпидемическим показаниям (лицам, контактировавшим с пациентом, которому установлен диагноз «корь» в возрасте от 9 месяцев до 55 лет, не болевшим корью, не имеющим документального подтверждения о прививках против кори или защитного иммунитета).



### ВАЖНО ПОМНИТЬ:

что при появлении симптомов инфекционного заболевания не заниматься самолечением, обратиться к врачу (а в случае, если Вы являетесь контактным в очаге – вызвать врача на дом или бригаду скорой медицинской помощи), минимизировать контакты, соблюдать респираторный этикет



# КОРЬ

**Сделайте прививку —  
это защитит  
от кори!**


Государственное учреждение  
“Брестский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии”

Брест, 2024

*забытая старая  
или современная инфекция?*

## ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

температура до 38°C и выше, вялость, головная боль, покраснение глаз, слезотечение, раздражительность, присоединяются обильный насморк, чихание, кашель. Только на 4-5-й день появляется сыпь за ушами, на спинке носа, на щеках от розового до насыщенного красного цвета, которая быстро распространяется на все лицо и шею, на следующий день она уже на теле, а далее — на руках и ногах.



## ОПАСНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕСЕТ КОРЬ:

- она может «стирать» до 70% иммунной памяти, как следствие, человек становится восприимчив даже к перенесенным ранее инфекциям;

- осложнения — пневмония, бронхит, ларинготрахеит, миокардит, менингит, менингоэнцефалит, слепота, глухота.

И самое страшное осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит, который может проявиться спустя несколько лет после перенесенной кори. В группе риска — дети, которые переболели корью до года. Данное осложнение характеризуется нарастающим снижением интеллекта, нарушением двигательной активности, эпилептическими припадками, как правило, приводит к летальному исходу в течение 1-3 лет после заболевания.

Методов специфического лечения кори не существует, но заболевание можно предупредить: достаточно сделать прививку против кори, которая в настоящее время остается самым безопасным и надежным методом профилактики.

Источником инфекции выступает больной человек, который может заражать других уже за 2-3 дня до появления симптомов и еще 4 дня после появления сыпи!

**Вирус распространяется при кашле, чихании, разговоре, смехе.**

Вирус отличается исключительной летучестью (может распространяться на значительные расстояния по вентиляционным каналам, лестничным маршам), и заразностью (при контакте с заболевшим 9 из 10 человек, у которых нет иммунитета к кори, заболевают).

**КОРЬ - это крайне заразное заболевание вирусного происхождения**